

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFORMACION GENERAL:

BORO-MAX™ es una formulación de nutrientes para suelos y foliar que es una fuente altamente estable y orgánicamente complejo de boro; sal buferizada y formulada para asegurar una máxima asimilación y traslocación. Suministra el boro necesario para la actividad metabólica y propicia el crecimiento y maduración, mejora la calidad del cultivo, mejora el metabolismo de proteínas y reduce la acumulación de nitrato en hojas jóvenes, aumenta la viabilidad del polen y polinización en la floración, mejora la transportación de azúcares en la planta. Síntomas de deficiencias: tallo grande o raíz enmarañada, las hojas jóvenes se tornan descoloridas y mueren.

Color ámbar claro, líquido casi neutro que tiene un olor único, característico. El líquido y los vapores pueden causar irritación ocular moderada a severa y puede causar irritación moderada de la piel. La inhalación de vapores puede causar irritación en el tracto respiratorio. La ingestión puede causar irritación en el tracto gastrointestinal.

CLASIFICACIÓN: categoría de peligro 5-PUEDA SER perjudicial si se traga
PALABRA DE SEÑAL: ADVERTENCIA
PELIGRO DE ESTADO: H303-ADVERTENCIA-Puede ser nocivo si se ingiere.
Recomendaciones: P312 Llamar a un centro de envenenamiento / el médico si se encuentra mal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Lea cuidadosamente la etiqueta.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto: cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule.
- Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla.
- Evite el contacto con la piel.
- Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión accidental provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
- En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel para evitar irritación, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

- **BORO-MAX™** es de baja toxicidad para las especies acuáticas y a las aves.
- No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, canales o depósitos de agua lavando o vertiendo en ellos residuos de productos.
- CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO. LAVE EL ENVASE TRES VECES ANTES DE DESECHARLO.
- La disposición de los envases vacíos se hará conforme con los reglamentos de materia de residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.
- Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.

H U M A G R O®

BORO-MAX™

ANALISIS GARANTIZADO + 10 B

Boron (B)..... 10.00%

Derivado de ácido bórico.

Adicionalmente contiene
10.0% de complejos de materia orgánica
derivada de leonardita.

PRECAUCION:

NO SE ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
NO REUTILICE ESTE ENVASE. DESTRUYASE.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

LOTE: xxxxxx
FECHA DE FABRICACION: xxxxxx
FECHA DE CADUCIDAD: 3 años a partir de fabricación
CONTENIDO NETO: 1.30 kilogramos por litro @ 20°
pH 6.6 - 6.6

®Marcas registradas de
Bio Huma Netics,® Inc.
025-07272020

**HUMA
GRO**

FORMULADO Y FABRICADO EN E.U.A.
POR: BIO HUMA NETICS,® INC.
1331 W. Houston Ave.
Gilbert, AZ 85233 E.U.A.
001-480-961-1220
www.humagro.com

- 1 Litro
Peso Neto 1.30 Kilogramos
- 10 Litros
Peso Neto 13.00 Kilogramos
- 20 Litros
Peso Neto 26.00 Kilogramos
- 1,040 Litros
Peso Neto 1,352 Kilogramos

©2005-2020 Bio Huma Netics,® Inc.

INSTRUCCIONES DE USO:

AGITE BIEN LA MEZCLA ANTES DE USARLO. NUNCA APLICAR EN CONCENTRACIONES MAYORES DE 10%. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. Siempre use el equipo de aplicación limpio y en buen estado. Antes de aplicar **BORO-MAX™** enjuague el tanque, bomba de aspersión y las mangueras con una solución neutralizadora.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO AL SUELO:

BORO-MAX™ puede ser aplicado solo al suelo con agua suficiente para cobertura óptima. También puede ser mezclado con la mayoría de las soluciones de fertilizantes y herbicidas para mejorar el cubrimiento de la aplicación. Para obtener mejores resultados concentre **BORO-MAX™** cerca de la zona radicular.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO AL FOLLAJE:

BORO-MAX™ puede ser aplicado foliar solo o conjunto con aspersiones de nutrientes foliares, reguladores de crecimiento, herbicidas, plaguicidas y otros fertilizantes líquidos. Siempre aplica con suficiente agua para asegurar un cubrimiento uniforme sin causar escurrimiento en las hojas.

Método de Aplicación	Dosis/ Ha Cultivos de Campo	Dosis/ Ha Viñedos o Frutales
General al suelo o en riego rodado	2.5 lt. máximo	2.5 lt. máximo
Inyectado en banda o por cinta de goteo o micro aspersión	1.25 lt. máximo	1.25 lt. máximo
Foliar general o en riego por aspersión	1.25 lt. máximo	---
Foliar en banda	.625 lt. máximo	2.5 lt. máximo

TIEMPO, FRECUENCIA E INTERVALOS:

Las recomendaciones de dosis, métodos y tiempo de aplicación varía de acuerdo con las necesidades del cultivo, los niveles de nutrientes disponible en el suelo, aplicaciones previas de fertilizante, al tipo de condiciones físicas del suelo y al estado de desarrollo del cultivo. Todas las aplicaciones deben hacerse de acuerdo a análisis de suelo y a análisis foliar y/o con ayuda de un especialista. **BORO-MAX™** debe ser aplicado cuando por experiencia practica, observación visual o cuando los análisis de suelo o tejido indique la necesidad de boro. **BORO-MAX™** puede ser aplicado cada 7 a 10 días como sea requerido para satisfacer las necesidades nutrimentales.

CONTRAINDICACIONES:

Evite la aplicación foliar de **BORO-MAX™** en las horas altas de calor del día. Aplique en la mañana o por la tarde hasta tres horas después del ocaso. La temperatura óptima del aire para las aplicaciones es de 15° a 30°C. No aplique **BORO-MAX™** en plantas bajo condiciones de sequía excesiva o inundación.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos de fuerte reacción ácida. Tome precaución al mezclar con soluciones con pH por abajo de 3.0 porque la solución puede calentarse ligeramente y producir espuma. Es compatible con la mayoría de las soluciones de fertilizantes o con la mayoría de los agroquímicos siempre y cuando estén registrados y autorizados en los cultivos a aplicar. Tome precaución al combinar con mezclas de multinutrientes o con alto contenido de calcio, potasio, o azufre. Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y las diluciones indicadas en esta etiqueta.

AVISO DE GARANTIA:

Bio Huma Netics,® Inc. garantiza el contenido neto y la formulación correcta de este producto. **Bio Huma Netics,® Inc.** no otorga garantía por los resultados derivados del uso, manejo y aplicación de este producto ya que se encuentra fuera de su control. También no asume responsabilidad por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo o aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

LIGERAMENTE TÓXICO

LIGERAMENTE TÓXICO