LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INFORMACION GENERAL:

Líquido turbio, de color cafe claro que no tiene olor característico. El líquido y los vapores pueden ser irritantes para los ojos y posiblemente la piel. La inhalación de vapores puede ser irritante para el tracto respiratorio. La ingestión de este producto puede causar irritación gastrointestinal, con efectos sobre el sistema cardiovascular y nervioso central.

CLASIFICACIÓN: de la piel Irritación-PELIGRO DE CATEGORÍA 3 PALABRA DE SEÑAL: ADVERTENCIA

PELIGRO DE ESTADO: H316-ADVERTENCIA-causa irritación leve de la piel Consejos de prudencia: P332 + P313 En caso de irritación de la piel, obtener atención médica / consejo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- **SOIL-MAX**™ es un producto ligeramente tóxico.
- Lea cuidadosamente la etiqueta completa.
- No coma, beba o fume cuando esté manejando el producto.
- Use el equipo de protección adecuado al aplicar este producto: cubre boca, lentes, guantes, overol, gorra y botas de hule.
- Evite inhalar el concentrado o la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla.
- Evite el contacto con la piel y ojos.
- Después de la jornada de trabajo, báñese, cámbiese y use ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de ingestión accidental provoque el vómito inmediatamente, introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.
- En caso de salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 10 a 15 minutos con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel para evitar irritación, lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE AL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Grupo químico: Fertilizante Bioestimulante. No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

- SOIL-MAX® es de baja toxicidad para las especies acuáticas y aves.
- No contamine el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, canales o depósitos de agua lavando o vertiendo en ellos residuos de productos.
- CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO. LAVE EL ENVASE TRES VECES ANTES DE DESECHARLO.
- La disposición de los envases vacíos se hará conforme con los reglamentos de materia de residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- No se almacene ni transporte junto con productos alimenticios, ropa
- o forrajes. Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use.
- Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, a la sombra y protegido de la intemperie.

SOIL-MAX[™]





°Marcas registradas de Bio Huma Netics,° Inc. GS-007-07292020

FORMULADO Y FABRICADO EN E.U.A. POR BIO HUMA NETICS, INC. 1331 W. Houston Ave. Gilbert, AZ 85233 E.U.A. 001-480-961-1220 www.humagro.com

☐ 1 Litro
Peso Neto 1.05 Kilogramos

- 10 Litros Peso Neto 10.50 Kilogramos
- ☐ 20 Litros Peso Neto 21.00 Kilogramos
- ☐ 1,040 Litros Peso Neto 1,092 Kilogramos

°2005-2020 Bio Huma Netics,® Inc.

INSTRUCCIONES DE USO:

AGITE BIEN LA MEZCLA ANTES DE USARLO. NUNCA APLICAR EN CONCENTRACIONES MAYORES DE 10%. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN. Siempre use el equipo de aplicación limpio y en buen estado. Antes de aplicar **SOIL-MAX**™ enjuague el tanque, bomba de aspersión y las mangueras con una solución neutralizadora.

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:

SOIL-MAX^{∞} puede ser aplicado solo al suelo con agua suficiente para cobertura óptima. También puede ser mezclado con la mayoría de las soluciones de fertilizantes y herbicidas para mejorar el cubrimiento de la aplicación. Para obtener mejores resultados, concentre **SOIL-MAX** $^{\infty}$ cerca de la zona radícular.

Método de Aplicación	Dosis por 100 metros cuadrados	Dosis por Hectárea
General al suelo por spray y incorporación	60 ml máximo	5 litros máximo
A través del riego por aspersión	60 ml máximo	5 litros máximo
A través del riego rodado o por inundación	60 ml máximo	5 litros máximo
Inyectado al suelo en banda	30 ml máximo	2.5 litros máximo
A través del riego por goteo o micro aspersión	30 ml máximo	2.5 litros máximo

SOIL-MAX™ debe ser incorporado físicamente o por el riego en el suelo inmediatamente después de ser aplicado. Regar en caso de que el suelo esté seco.

	Hortalizas	Frutales o Vid
PRIMERA APLICACION	Entre 15-20 días antes de siembra hasta el incicio de siembra, según necesidad del suelo	Según necesidad de suelo y raíces o anualmente después de la consecha.
INTERVALOS	En aplicaciones multiples, 15-20 días mínimo entre cada aplicación	En aplicaciones multiples, 15-20 días mínimo entre cada aplicación

CONTRAINDICACIONES:

SOIL-MAX™ al mezclarse con formulaciones ácidas o con soluciones de nitrato de calcio, puede hacer espuma o separarse. En estas situaciones, agitar bien. **SOIL-MAX**™ pueda ser impregnado en los granulados. Tenga cuidado al mezclar con herbicidas. **SOIL-MAX**™ puede aumentar la actividad de los herbicidas. Tal vez sean requeridas dosis más bajas de químicos al mezclar con **SOIL-MAX**™.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **SOIL-MAX**[™] con productos de fuerte reacción ácida. Es compatible con la mayoría de los fungicidas, insecticidas, reguladores de crecimiento, fertilizantes líquidos y herbicidas, siempre y cuando estén registrados y autorizados para los cultivos destinados. Cuando desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos bajo las dosis y diluiciones indicadas en esta etiqueta.

AVISO DE GARANTIA:

Bio Huma Netics, ** **Inc.** garantiza el contenido neto y la formulación correcta de este producto. **Bio Huma Netics,** ** **Inc.** no otorga garantía por los resultados derivados del uso, manejo y aplicación de este producto ya que se encuentra fuera de su control. También no asume responsabilidad por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo o aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.