

JACKPOT®

ANALYSE GARANTIE 0-1-20

Phosphate disponible (P₂O₅) 1,00 %

Potasse soluble (K₂O) 20,00 %

Bore (B) 0,50 %

Provenant de : Acide phosphorique, hydroxyde de potassium, acide borique.

Fourni par : MICRO CARBON TECHNOLOGY®

CONTIENT AUSSI UN INGRÉDIENT ALIMENTAIRE NON VÉGÉTAL :

5,5 % matière organique (dérivée de la léonardite)

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

• Bien secouer avant utilisation. • Conçu pour être appliqué par une application foliaire. • JACKPOT® fournit du phosphore, du potassium et du bore aux cultures et doit être appliqué lorsqu'une analyse de la période, du tissu et du sol en détermine le besoin et le dosage de ce produit. • Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l'application est concentrée à la surface des feuilles. • Peut être appliqué en combinaison avec une substance de croissance, un pesticide ou d'autres engrais liquides compatibles. • Pour vérifier la compatibilité, effectuer un essai sur une petite quantité dans un bocal. • Appliquer des pulvérisations foliaires avec une quantité d'eau suffisante pour assurer une couverture uniforme sans que le produit ne coule des surfaces des feuilles. • Ne pas appliquer ce produit de manière foliaire dans des concentrations supérieures à 5 %. • Pour des résultats optimaux, appliquer tôt le matin ou le soir quand les températures sont optimales pour l'application foliaire. Ne pas appliquer les substances nutritives HUMA GRO® pendant la période la plus chaude de la journée ou sur des plantes stressées par la sécheresse ou des inondations. • Les moments propices, les intervalles et les dosages des applications peuvent varier en fonction des exigences des cultures particulières, l'étape du développement, les niveaux des substances nutritives dans le sol et l'état nutritionnel global de la culture. • Pour des résultats optimaux, le JACKPOT® doit être appliqué avec le HUMA GRO® CALCIUM à la moitié du dosage du JACKPOT®. Un inhibiteur de nitrate peut être appliqué avec le JACKPOT®, à condition que les niveaux d'azote du tissu des feuilles soient supérieurs à 3 % ou supérieurs à 10 000 ppm pour l'analyse pétiole. • La première application doit avoir lieu 28 jours avant l'effeuillage ou la récolte. • Les applications peuvent être effectuées aussi souvent que tous les 7 à 10 jours, au besoin. • Demandez l'avis de votre représentant HUMA GRO® local ou d'un autre spécialiste en agriculture pour obtenir des recommandations propres à une culture en particulier. • Ne pas entreposer ce produit à une température inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 30 °C (90 °F).

Ce produit est destiné à être un supplément à un programme de fertilisation régulier et ne fournira pas, par lui-même, toutes les substances nutritives dont les cultures agricoles ont normalement besoin.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION : Conserver le produit dans le contenant d'origine. Ne pas transférer dans les contenants pour aliments ou boissons. Rincer trois fois lorsqu'il est vide pour pouvoir le recycler. Toujours éliminer le contenant conformément aux réglementations locales, provinciales et/ou fédérales.

MÉTHODE D'APPLICATION

DOSAGE SUGGÉRÉ PAR HECTARE

Plantes de grande culture

Arbre ou cucurbitacées

Application foliaire par bandes avec une couverture de 50 %

jusqu'à 2,5 litres

Application foliaire par épandeur rotatif ou gicleurs : installation solide, linéaires, rotatifs (100 % de vitesse)

jusqu'à 5 litres

jusqu'à 10 litres

En bande sur le sol ou par injection, par gaine perforée ou par microgicleurs

jusqu'à 5 litres

jusqu'à 10 litres

Incorporation au sol par épandeur rotatif, irrigation par sillons ou par inondation

jusqu'à 10 litres

jusqu'à 20 litres

CONDITIONS DE VENTE : Les renseignements contenus sur la présente étiquette sont censés être exacts et fiables. L'acheteur et l'utilisateur reconnaissent et assument la pleine responsabilité découlant de l'utilisation de ce produit. Suivre scrupuleusement les consignes. La période, la méthode d'application, les conditions climatiques, l'état des cultures et d'autres facteurs sont indépendants de la volonté du vendeur.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Des renseignements au sujet des contenus et des niveaux de métaux contenus dans ce produit peuvent être consultés à l'adresse <http://www.aapfco.org/metals.html>

DANGER : Cet engrais contient du bore (B). L'utilisation de cet engrais sur des cultures autres que celles recommandées peut causer des dommages sévères aux cultures.

Liquide très alcalin brun violacé foncé légèrement trouble avec une odeur caractéristique. Le liquide et les brumes sont corrosifs pour tous les tissus touchés. L'inhalation des brumes peut causer des lésions pulmonaires permanentes. Modérément toxique par indigestion. Ce produit peut réagir vigoureusement avec d'autres acides et substances, matériaux ou produits.

CLASSIFICATION : CORROSION CUTANÉE – CATÉGORIE 1A

MENTION D'AVERTISSEMENT : DANGER

MENTION DE DANGER : H314 Cause des brûlures cutanées sévères et des affections oculaires.

MISE EN GARDE : P260 Ne pas respirer les poussières/brumes/vapeurs; P280 Porter des gants protecteurs, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale; P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

1,25 kg par litre à 20 °C

10,87 lb par gallon à 68 °F.

pH ≥ 14,0

10 litres • Poids net 12,50 kg

Numéro de lot 12345678

HUMA GRO®

*Marques déposées et fabriquées par

BIO HUMA NETICS, INC. © 2005-2021

1331 W. Houston Ave., Gilbert, AZ 85233 • 480.961.1220

www.HumaGro.com • CA-235-08032020